هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2013
الموضوع

NS22

الصفحة 1 / 3

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	3
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها	المعامل	7

معلومات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
- مدة إنجاز موضوع الامتحان : **3** ساعات ؛
- **عدد الصفحات : 3 صفحات** (الصفحة الأولى تتضمن معلومات والصفحتان المتبقيتان تتضمنان تمارين الامتحان)؛
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
- في حالة عدم تمكن المترشح من الإجابة عن سؤال ما ، يمكنه استعمال نتيجة هذا السؤال لمعالجة الأسئلة الموالية ؛
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة ؛
- بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين ، فكل رمز مرتبط بالتمرين المستعمل فيه ولا علاقة له بالتمارين السابقة أو اللاحقة .

معلومات خاصة

- يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها و تتوزع حسب المجالات كما يلي :

التمرين	المجال	النقطة الممنوحة
التمرين الأول	الهندسة الفضائية	3 نقط
التمرين الثاني	الأعداد العقدية	3 نقط
التمرين الثالث	حساب الاحتمالات	3 نقط
التمرين الرابع	المتتاليات العددية	3 نقط
التمرين الخامس	دراسة دالة وحساب التكامل	8 نقط

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

الموضوع

التمرين الأول (3 ن)

نعتبر ، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ، النقط $A(-1,1,0)$ و $B(1,0,1)$ و $\Omega(1,1,-1)$ و الفلكة (S) التي مركزها Ω وشعاعها 3

1 **1) أ- بين أن** $\overrightarrow{OA}\wedge\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ **و تحقق من أن** $x+y-z=0$ **معادلة ديكارتية للمستوى** (OAB)

1 **ب- تحقق من أن** $d(\Omega,(OAB))=\sqrt{3}$ **ثم بين أن** (OAB) **يقطع الفلكة** (S) **وفق دائرة** (Γ) **شعاعها** $\sqrt{6}$

2) ليكن (Δ) **المستقيم المار من النقطة** Ω **والعمودي على المستوى** (OAB)

0.5 **أ- بين أن :** $\begin{cases}x=1+t\\y=1+t\\z=-1-t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$ **تمثيل بارامتري للمستقيم** (Δ)

0.5 **ب- حدد مثلوث إحداثيات مركز الدائرة** (Γ)

التمرين الثاني (3 ن)

نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{u},\vec{v})$ ، النقط A و B و C التي ألحاقها على التوالي هي a و b و c بحيث : $a=7+2i$ و $b=4+8i$ و $c=-2+5i$

0.75 **1) أ- تحقق من أن** $(1+i)(-3+6i)=-9+3i$ **و بين أن** $\dfrac{c-a}{b-a}=1+i$

1 **ب- استنتج أن** $AC=AB\sqrt{2}$ **وأعط قياسا للزاوية الموجهة** $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$

2) ليكن R **الدوران الذي مركزه** B **و زاويته** $\dfrac{\pi}{2}$

0.75 **أ- بين أن لحق النقطة** D **صورة النقطة** A **بالدوران** R **هو** $d=10+11i$

0.5 **ب- احسب** $\dfrac{d-c}{b-c}$ **و استنتج أن النقط** B **و** C **و** D **مستقيمية .**

التمرين الثالث (3 ن)

يحتوي صندوق على 10 كرات : خمس كرات حمراء وثلاث كرات خضراء وكرتان بيضاوان (لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس) .

نسحب عشوائيا و في آن واحد أربع كرات من الصندوق .

1.5 **1) نعتبر الحدثين التاليين :** A : " الحصول على كرتين حمراوين و كرتين خضراوين "

B : " لا توجد أية كرة بيضاء من بين الكرات الأربع المسحوبة "

بين أن $P(A)=\dfrac{1}{7}$ **و** $P(B)=\dfrac{1}{3}$

2) ليكن X **المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات البيضاء المسحوبة .**

0.25 **أ- تحقق من أن القيم التي يأخذها المتغير العشوائي** X **هي** 0 و 1 و 2

1.25 **ب- بين أن** $P(X=1)=\dfrac{8}{15}$ **ثم حدد قانون احتمال المتغير العشوائي** X

التمرين الرابع (3 ن)

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

لتكن $(u_n)_{n\in IN^*}$ المتتالية العددية المعرفة بما يلي : $u_1=0$ و $u_{n+1}=\frac{25}{10-u_n}$ لكل n من IN^*

1) تحقق من أن $5-u_{n+1}=\frac{5(5-u_n)}{5+(5-u_n)}$ لكل n من IN^* و بين بالترجع أن $5-u_n>0$ لكل n من IN^* — 1

2) نعتبر المتتالية العددية $(v_n)_{n\in IN^*}$ المعرفة بما يلي : $v_n=\frac{5}{5-u_n}$ لكل n من IN^*

أ- بين أن $v_{n+1}=\frac{10-u_n}{5-u_n}$ لكل n من IN^* ثم تحقق من أن $v_{n+1}-v_n=1$ لكل n من IN^* — 0.75

ب- بين أن $v_n=n$ لكل n من IN^* و استنتج أن $u_n=5-\frac{5}{n}$ لكل n من IN^* — 1

ج- حدد $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ — 0.25

التمرين الخامس (8 ن)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على IR بما يلي : $f(x)=(x-2)^2e^x$

و ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $1\,cm$)

1) أ - بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ — 0.25

ب- بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=+\infty$ ثم استنتج أن المنحنى (C) يقبل، بجوار $+\infty$ ، فرعا شلجميا يتم تحديد اتجاهه. — 0.5

2) أ - تحقق من أن $f(x)=x^2e^x-4xe^x+4e^x$ لكل x من IR — 0.25

ب- بين أن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$ و أول هذه النتيجة هندسيا (نذكر أن $\lim\limits_{x\to-\infty} x^ne^x=0$ لكل n من IN^*) — 0.5

3) أ- بين أن $f'(x)=x(x-2)e^x$ لكل x من IR — 0.75

ب- بين أن الدالة f تزايدية على كل من المجالين $]-\infty,0]$ و $[2,+\infty[$ وأن الدالة f تناقصية على المجال $[0,2]$ — 1

ج- ضع جدول تغيرات الدالة f على IR — 0.5

4) أ- بين أن $f''(x)=(x^2-2)e^x$ لكل x من IR ثم استنتج أن للمنحنى (C) نقطتي انعطاف تحديد أرتوبيهما غير مطلوب . — 1

ب- أنشئ (C) في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$ — 1

5) أ- بين أن $H:x\mapsto(x-1)e^x$ دالة أصلية للدالة $h:x\mapsto xe^x$ على IR ثم احسب $\int_0^1 xe^x\,dx$ — 0.5

ب- باستعمال مكاملة بالأجزاء، بين أن: $\int_0^1 x^2e^x\,dx=e-2$ — 0.75

ج- بين أن مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) ومحور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=1$ هي $5(e-2)\ cm^2$ — 0.5

6) استعمل المنحنى (C) لإعطاء عدد حلول المعادلة : $x^2=e^{-x}+4x-4$, $x\in IR$ — 0.5

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma