هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

I. دالة أصلية لدالة عددية:

01. تقديم دالة أصلية لدالة :

❖ نشاط: لنعتبر الدالة : $f(x) = 4x^2 - 5x + 3$.

1) هل توجد دالة $F(x)$ تحقق ما يلي $F'(x) = f(x)$ ؟

2) حاول أن تبحث عن صيغة ل $F(x)$.

❖ مفردات:

كل دالة $F(x)$ تحقق $F'(x) = f(x)$ تسمى دالة أصلية للدالة $f(x)$

❖ تعريف

لتكن f دالة معرفة على مجال I .

نقول إن دالة F هي دالة أصلية للدالة f على I اذا كانت F قابلة للاشتقاق على I وكان: $\forall x \in I : F'(x) = f(x)$

❖ أمثلة :

1) دالة أصلية للدالة $f(x) = 4x + 2$ على $\mathbb{R}$ هي $F(x) = 2x^2 + 2x$

2) دالة أصلية للدالة $f(x) = \cos x$ على $\mathbb{R}$ هي $F(x) = \sin x$

02. تحديد جميع الدوال الأصلية لدالة f :

نشاط : دالة أصلية للدالة $f : x \to 2x + 3$ على $\mathbb{R}$ هي $F : x \to x^2 + 3x$ c ، من $\mathbb{R}$

هل هناك دالة أخرى $G(x)$ حيث G دالة أصلية للدالة f ؟

❖ خاصية

لتكن f دالة عددية تقبل دالة أصلية F على مجال I .

مجموعة الدوال الأصلية للدالة f على I هي المجموعة المكونة من الدوال التي هي على شكل: $F(x) + c$ مع $c \in \mathbb{R}$

❖ مثال:

نعتبر الدالة $f(x) = 10x - 2$ المعرفة على $\mathbb{R}$.

1) هل الدالة : $F(x) = 5x^2 - 2x + 3$ هي دالة أصلية للدالة $f(x) = 10x - 2$ على $\mathbb{R}$.

2) حدد جميع الدوال الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

03. الدالة الأصلية $G(x)$ حيث: $G(x_0) = y_0$.

❖ نشاط: لنعتبر الدالة العددية المعرفة ب: $f(x) = 2x + 3$.

1) حدد الدوال الأصلية ل f :

2) حدد دوال الأصلية G ل f (إذا كان ممكن) حيث $G(1) = 7$.

3) كم من دالة تحقق ذلك ؟

❖ خاصية

لتكن f دالة عددية تقبل دالة أصلية F على مجال I . ليكن x_0 من I و y_0 من $\mathbb{R}$.

توجد دالة أصلية وحيدة G للدالة f على المجال I حيث: $G(x_0) = y_0$.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

❖ **مثال:** نحدد الدالة الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ حيث $f(x)=x^3-2x+3$ و التي تأخذ القيمة 7– عند 0.

04. الاتصال و الدوال الأصلية:

❖ **خاصية :**

> كل دالة متصلة f على مجال I تقبل دالة أصلية F على I.

❖ **مثال 1:** كل دالة حدودية تقبل دالة أصلية على $\mathbb{R}$.

❖ **مثال 2:** كل دالة جذرية تقبل دالة أصلية على مجموعة تعريفها .

❖ **مثال 3:** $f(x)=\sqrt{x}$ تقبل دالة أصلية على $[0,+\infty[$

05. دالة أصلية: لمجموع دالتين- جداء دالة في عدد حقيقي α

❖ **نشاط:**

F دالة أصلية للدالة f على I. G دالة أصلية للدالة g على I.

1) حدد دالة أصلية لدالة $f+g$.

2) حدد دالة أصلية لدالة $\alpha \times f$.

❖ **خاصية**

> إذا كانت F G دالتين أصليتين للدالتين f وg على مجال I على التوالي و $\alpha \in \mathbb{R}$.
>
> - $F+G$ هي دالة أصلية ل $f+g$.
> - $\alpha \times F$ هي دالة أصلية ل $\alpha \times f$.

❖ **مثال:** لنعتبر الدوال: $f(x)=3x$ و $x \mapsto \sin(x)$ و $h(x)=3x+2\cos(x)$ أوجد الدوال الأصلية للدوال السابقة.

II. الدوال الأصلية و العمليات:(جدول1 ورقة التمارين)

الدالة h	دالة الأصلية ل h هي H
$h=f'+g'$	$H=f+g$
$h=\alpha f'$	$H=\alpha f$
$h=f'\times g+f\times g'$	$H=f\times g$
$h=-\frac{g'}{g^2}$	$H=\frac{1}{g}$
$h=\frac{f'\times g-f\times g'}{g^2}$	$H=\frac{f}{g}$
$h=f'\times f^n$ مع $n\neq -1$	$H=\frac{1}{n+1}f^{n+1}$
$h=f'\times f^r$ مع $r\neq -1$	$H=\frac{1}{r+1}f^{r+1}$
$h=f'\times g'\circ f$	$H=g\circ f$
$h=f'(ax+b)$ مع $a\neq 0$	$H=\frac{1}{a}f(ax+b)$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

III. جدول دوال أصلية لدوال اعتيادية: (جدول2 ورقة التمارين)

الدالة f	الدوال الأصلية ل f
$f(x)=a;(a\in\mathbb{R})$	$F(x)=ax+c$
$f(x)=x$	$F(x)=\frac{1}{2}x^2+c$
$f(x)=x^n;\left(n\in\mathbb{Z}\setminus\{-1\}\right)$	$F(x)=\frac{1}{n+1}x^{n+1}+c$
$f(x)=x^r;\left(r\in\mathbb{Q}\setminus\{-1\}\right)$	$F(x)=\frac{1}{r+1}x^{r+1}+c$
$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x)=2\sqrt{x}+c$
$f(x)=\sin(x)$	$F(x)=-\cos(x)+c$
$f(x)=\sin(ax+b)\ a\neq 0$	$F(x)=-\frac{1}{a}\cos(ax+b)+c$
$f(x)=\cos(x)$	$F(x)=\sin(x)+c$
$f(x)=\cos(ax+b)\ a\neq 0$	$F(x)=\frac{1}{a}\sin(ax+b)+c$
$f(x)=1+\tan^2(x)$	$F(x)=\tan(x)+c$
$f(x)=\frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}$	$F(x)=2\sqrt{f(x)}+c$
$f(x)=\frac{1}{x^2}$	$F(x)=-\frac{1}{x}+c$

ملحوظة: C عدد حقيقي .

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma