هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

تمارين

تمارين محلولة

تمرين1

حدد $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-e^{x}}{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x-3}{x}\right)$; $\lim\limits_{x\to 0^{+}} x^{\sqrt{x}}$

الحل

نحدد $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-e^{x}}{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x-3}{x}\right)$; $\lim\limits_{x\to 0^{+}} x^{\sqrt{x}}$

* $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-e^{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{e^{2x}-1}{x}-\dfrac{e^{x}-1}{x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\left[2\dfrac{e^{2x}-1}{2x}-\dfrac{e^{x}-1}{x}\right]=2-1=1$

* نضع $t=-\dfrac{3}{x}$ أي $x=-\dfrac{3}{t}$

ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x-3}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(1-\dfrac{3}{x}\right)=\lim\limits_{t\to 0}\left[-3\dfrac{\ln(1+t)}{t}\right]=-3$

* $\lim\limits_{x\to 0^{+}} x^{\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^{+}} e^{\sqrt{x}\ln x}=\lim\limits_{x\to 0^{+}} e^{2\sqrt{x}\ln\sqrt{x}}=1$

تمرين2

نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ: $f(x)=\ln\left(e^{2x}-3e^{x}+3\right)$

1- حدد D_f و نهايات f عند محدات D_f

2- حل المتراجحة $f(x)\geq 0$

3- حدد $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-2x)$

الحل

$f(x)=\ln\left(e^{2x}-3e^{x}+3\right)$

4- نحدد D_f

لتكن $x\in\mathbb{R}$

$x\in D_f \Leftrightarrow e^{2x}-3e^{x}+3\succ 0$

ليكن Δ مميز X^2-3X+3 و منه $\Delta=-3$ و بالتالي $e^{2x}-3e^{x}+3\succ 0$ $\forall x\in\mathbb{R}$

إذن $D_f=\mathbb{R}$

* نحدد نهايات f عند محدات D_f

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(e^{2x}-3e^{x}+3\right)\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left[e^{2x}\left(1-3e^{-x}+3e^{-2x}\right)\right]=+\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(e^{2x}-3e^{x}+3\right)=\ln 3$

5- نحل المتراجحة $f(x)\geq 0$

$f(x)\geq 0\Leftrightarrow\ln\left(e^{2x}-3e^{x}+3\right)\geq 0$

$f(x)\geq 0\Leftrightarrow e^{2x}-3e^{x}+3\geq 1$

$f(x)\geq 0\Leftrightarrow e^{2x}-3e^{x}+2\geq 0$

$f(x)\geq 0\Leftrightarrow\left(e^{x}-1\right)\left(e^{x}-2\right)\geq 0$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

$f(x)\geq 0 \Leftrightarrow e^x \in [0;1]\cup[2;+\infty[$

$f(x)\geq 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty;0]\cup[\ln 2;+\infty[$

إذن $S=]-\infty;0]\cup[\ln 2;+\infty[$

6- نحدد $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-2x)$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-2x)=\lim_{x\to+\infty}(\ln(e^{2x}-3e^x+3)-2x)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1-\frac{3}{e^x}+\frac{3}{e^{2x}}\right)=0$$

تمرين3

نعتبر f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x)=x+1+e^{-x}$

1- أ- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

ب- أحسب $f'(x)$ و أعط جدول تغيرات f و استنتج إشارة $f(x)$

2- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x)=\ln(x+1+e^{-x})$

أ- أدرس تغيرات g و أعط جدول تغيراتها

ب- a) حدد $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)+x$ وأول النتيجة هندسيا

b) بين أن $\forall x\in]-\infty;-1[\quad g(x)+x\prec 0$

c) بين أن $\forall x\in\mathbb{R}^{+*}\quad 0\prec g(x)-\ln x\leq\ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$ استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)-\ln x$.

الحل

$f(x)=x+1+e^{-x}$

1- أ- نحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}x+1+e^{-x}=+\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}x+1+e^{-x}=\lim_{x\to-\infty}-x\left(-1-\frac{1}{x}+\frac{e^{-x}}{-x}\right)=+\infty$$

ب- نحسب $f'(x)$ و نعطي جدول تغيرات f و نستنتج إشارة $f(x)$

$\forall x\in\mathbb{R}\quad f'(x)=1-e^{-x}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	
f	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

لدينا f تناقصية على $]-\infty;0]$ و تزايدية على $[0;+\infty[$ و منه $\forall x\in\mathbb{R}\quad f(x)\geq f(0)\succ 0$

2- نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x)=\ln(x+1+e^{-x})$

أ- ندرس تغيرات g و نعطي جدول تغيراتها

$\forall x\in\mathbb{R}\quad g'(x)=\frac{1-e^{-x}}{x+1+e^{-x}}=\frac{f'(x)}{f(x)}$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		-	0	+	
g	$+\infty$	↘	$\ln 2$	↗	$+\infty$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

ب- a) نحدد $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)+x$ ونؤول النتيجة هندسيا

$$\lim_{x\to-\infty}\left(g(x)+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\ln\left(x+1+e^{-x}\right)+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left(\ln\left(x+1+e^{-x}\right)+\ln e^{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\ln\left(xe^{x}+e^{x}+1\right)=\lim_{x\to-\infty}\ln\left(-\frac{-x}{e^{-x}}+e^{x}+1\right)=0$$

ومنه المستقيم ذا المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى (C_g) بجوار $+\infty$

b) نبين أن $\forall x\in]-\infty;-1[\quad g(x)+x\prec 0$

$$\forall x\in\mathbb{R}\qquad g(x)+x=\ln\left(xe^{x}+e^{x}+1\right)=\ln\left((x+1)e^{x}+1\right)$$

ليكن $x\in]-\infty;-1[$ ومنه $x+1\prec 0$ و بالتالي $e^{x}(x+1)+1\prec 1$

و منه $\ln\left(e^{x}(x+1)+1\right)\prec 0$ إذن $\forall x\in]-\infty;-1[\quad g(x)+x\prec 0$

c) نبين أن $\forall x\in\mathbb{R}^{+*}\quad 0\prec g(x)-\ln x\le\ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$. و نستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)-\ln x$

$$\forall x\in\mathbb{R}^{+*}\quad g(x)-\ln x=\ln\left(x+1+e^{-x}\right)-\ln x=\ln\left(\frac{x+1+e^{-x}}{x}\right)$$

لدينا $\frac{x+1+e^{-x}}{x}\succ 1$ إذن $\forall x\in\mathbb{R}^{+*}\quad g(x)-\ln x\succ 0$

لدينا $e^{-x}\prec 1$ ومنه $\forall x\in\mathbb{R}^{+*}\quad 1+x+e^{-x}\prec x+2$ و بالتالي $\frac{1+x+e^{-x}}{x}\prec\frac{x+2}{x}$

ومنه $\ln\frac{1+x+e^{-x}}{x}\prec\ln\frac{x+2}{x}$

إذن $\forall x\in\mathbb{R}^{+*}\quad 0\prec g(x)-\ln x\le\ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$

تمرين4

نعتبر الدالة العددية f لمتغير حقيقي المعرفة بما يلي

$$\begin{cases} f(x)=\left|2x\left(1-\ln x\right)\right| & x\succ 0\\ f(x)=e^{x}-1-2\sqrt{1-e^{x}} & x\le 0\end{cases}$$

1- أدرس اشتقاق و اتصال f عند النقطتين 0 و e
و أعط التأويل الهندسي للنتائج المحصل عليها

2- أحسب نهايات f عند محدات D_f ثم أدرس الفروع للانهائية لـ C_f

3- أدرس تغيرات f و أنشئ C_f $\left\|\vec{i}\right\|=\left\|\vec{j}\right\|=2\,cm$

4- بين أن g قصور الدالة f على $]-\infty;0]$ تقابل من $]-\infty;0]$ نحو مجال J يجيب تحديده

أحسب $g^{-1}(x)$ لكل x من J

الحل

$$\begin{cases} f(x)=\left|2x(1-\ln x)\right| & x\succ 0\\ f(x)=e^{x}-1-2\sqrt{1-e^{x}} & x\le 0\end{cases}$$

1- ندرس اتصال و اشتقاق f عند النقطتين 0 و e نؤول هندسيا للنتائج المحصل عليها

$$\lim_{x\to0^{+}} f(x)=\lim_{x\to0^{+}}\left|2x(1-\ln x)\right|=\lim_{x\to0^{+}}\left|2x-2x\ln x\right|=0=f(0)$$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} e^x - 1 - 2\sqrt{1-e^x} = 0 = f(0)$$

إذن f متصلة في 0

$$\lim_{x\to e} f(x) = \lim_{x\to e} \left|2x(1-\ln x)\right| = 0 = f(e)$$ إذن f متصلة في e

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\left|2x(1-\ln x)\right|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \left|2(1-\ln x)\right| = +\infty$$

إذن f غير قابلة للاشتقاق في 0 على اليمين و منحناها يقبل نصف مماس عمودي على يمين 0

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{e^x - 1 - 2\sqrt{1-e^x}}{x} = \lim_{x\to 0^-} \left[\frac{e^x-1}{x} + 2\frac{e^x-1}{x}\times\frac{1}{\sqrt{1-e^x}}\right] = +\infty$$

إذن f غير قابلة للاشتقاق في 0 على اليسار و منحناها يقبل نصف مماس عمودي على يسار 0

$$\lim_{x\to e^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-e} = \lim_{x\to e^+} \frac{\left|2x(1-\ln x)\right|}{x-e} = \lim_{x\to e^+} 2x\frac{\ln x - 1}{x-e} = 2e\times\frac{1}{e} = 2$$

إذن f قابلة للاشتقاق في e على اليمين و منحناها يقبل نصف مماس على يمين e معامله الموجه 2

$$\lim_{x\to e^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-e} = \lim_{x\to e^-} \frac{\left|2x(1-\ln x)\right|}{x-e} = \lim_{x\to e^-} -2x\frac{\ln x - 1}{x-e} = -2e\times\frac{1}{e} = -2$$

إذن f قابلة للاشتقاق في e على اليسار و منحناها يقبل نصف مماس على يسار e معامله الموجه -2

2- نحسب نهايات f عند محدات D_f ثم ندرس الفروع للانهائية لـ C_f

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} e^x - 1 - 2\sqrt{1-e^x} = -3$$ و $$\lim_{x\to +\infty} f(x) = \lim_{x\to +\infty} \left|2x(1-\ln x)\right| = +\infty$$

ومنه المستقيم ذا المعادلة $y=-3$ مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\left|2x(1-\ln x)\right|}{x} = \lim_{x\to +\infty} \left|2(1-\ln x)\right| = +\infty$$

ومنه (C_f) يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الأراتيب

3- ندرس تغيرات f و ننشئ C_f

$$\forall x\in]0;e[\quad f'(x) = \left[2x(1-\ln x)\right]' = 2(1-\ln x) - 2 = -\ln x$$

$$\forall x\in]e;+\infty[\quad f'(x) = \left[-2x(1-\ln x)\right]' = -2(1-\ln x) + 2 = \ln x$$


$$\forall x\in]e;+\infty[\quad f'(x) = \left(e^x - 1 - 2\sqrt{1-e^x}\right)' = e^x + \frac{e^x}{\sqrt{1-e^x}}$$

x	$-\infty$		0		1		e		$+\infty$
$f'(x)$		+	‖	+	0	-	‖	+	
$f(x)$	-3	↗	0	↗	2	↘	0	↗	$+\infty$

إنشاء (C_f)

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma



4- نبين أن g قصور الدالة f على $]-\infty;0]$ تقابل من $]-\infty;0]$ نحو مجال J يجيب تحديده

لدينا g متصلة و تزايدية قطعا على $]-\infty;0]$ و $g(]-\infty;0]) =]-3;0]$

ومنه g تقابل من $]-\infty;0]$ الى $J =]-3;0]$

نحسب $g^{-1}(x)$ لكل x من J

لتكن $y \in]-\infty;0]$ و $x \in]-3;0]$

$$g^{-1}(x) = y \Leftrightarrow g(y) = x$$

$$\Leftrightarrow e^y - 1 - 2\sqrt{1-e^y} = x$$

$$\Leftrightarrow 1 - e^y + 2\sqrt{1-e^y} + 1 = -x + 1$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{1-e^y} + 1\right)^2 = -x + 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1-e^y} = \sqrt{-x+1} - 1$$

$$\Leftrightarrow e^y = 1 - \left(\sqrt{-x+1} - 1\right)^2$$

$$\Leftrightarrow y = \ln\left[1 - \left(\sqrt{-x+1} - 1\right)^2\right]$$

اذن $g^{-1}(x) = \ln\left[1 - \left(\sqrt{-x+1} - 1\right)^2\right]$ $\forall x \in]-3;0]$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

تمرين5

نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة بـ $f(x)=2x+\dfrac{e^x}{e^x-1}$

1- حدد D_f و نهايات f عند محدات D_f

2- أدرس تغيرات f و أعط جدول تغيراتها

3- أدرس الفروع اللانهائية لمنحنى f

4- بين أن $A\left(0;\dfrac{1}{2}\right)$ مركز تماثل للمنحنى C_f

5- أنشئ C_f في مستوى منسوب إلى م.م.م

6- لتكن $m\in\mathbb{R}$

حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة $2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0$

الحل

$$f(x)=2x+\frac{e^x}{e^x-1}$$

1- نحدد D_f

لتكن $x\in\mathbb{R}$

$x\in D_f \Leftrightarrow e^x-1\neq 0 \Leftrightarrow x\neq 0$

إذن $D_f=]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$

نحدد نهايات f عند محدات D_f

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(2x+\frac{e^x}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(2x-\frac{1}{1-e^{-x}}\right)=+\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(2x+\frac{e^x}{e^x-1}\right)=-\infty$$

$$\lim_{x\to0^+} f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(2x+\frac{e^x}{e^x-1}\right)=+\infty \quad ; \quad \lim_{x\to0^-} f(x)=\lim_{x\to0^-}\left(2x+\frac{e^x}{e^x-1}\right)=-\infty$$

2- ندرس تغيرات f و نعطي جدول تغيراتها

$$\forall x\in\mathbb{R}^* \qquad f'(x)=2-\frac{e^x}{(e^x-1)^2}=\frac{2e^{2x}-5e^x+2}{(e^x-1)^2}$$

ليكن Δ مميز $2X^2-5X+2$ لدينا $\Delta=9$

ومنه جدرا $2X^2-5X+2$ هما $X_1=2$ و $X_2=\dfrac{1}{2}$

$$2X^2-5X+2\geq 0 \Leftrightarrow X\in\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]\cup[2;+\infty[$$

$$x\in\mathbb{R}^* \quad 2e^{2x}-5e^x+2\geq 0 \Leftrightarrow x\in\mathbb{R}^* \quad e^x\in\left]0;\frac{1}{2}\right]\cup[2;+\infty[$$

$$\Leftrightarrow x\in]-\infty,-\ln 2]\cup[\ln 2;+\infty[$$

ومنه $f'(x)\geq 0 \Leftrightarrow x\in]-\infty,-\ln 2]\cup[\ln 2;+\infty[$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

إذن f تزايدية على كل من $]-\infty,-\ln 2]$ و $[\ln 2;+\infty[$

f تناقصية على كل من $]0;\ln 2[$ و $]-\ln 2;0[$

جدول تغيرات f

x	$-\infty$		$-\ln 2$		0		$\ln 2$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$-1-2\ln 2$	↘	$+\infty$	↘	$2+2\ln 2$	↗	$+\infty$

3- ندرس الفروع اللانهائية لمنحنى f

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(2x+\frac{e^x}{e^x-1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(2-\frac{1}{x}\left(\frac{1}{1-e^{-x}}\right)\right)=2$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)-2x=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{e^x-1}=1$$

إذن المستقيم ذا المعادلة $y=2x+1$ مقارب للمنحنى C_f

لدينا $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)-2x=\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{e^x-1}=0$$

إذن المستقيم ذا المعادلة $y=2x$ مقارب للمنحنى C_f

4- نبين أن $A\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تماثل للمنحنى C_f


$$f(-x)=-2x+\frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}=-2x+\frac{1}{1+e^x} \quad \text{و} \quad 1-f(x)=1-2x-\frac{e^x}{e^x+1}=-2x+\frac{1}{1+e^x}$$

ومنه $f(-x)=1-f(x)$ إذن $A\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تماثل للمنحنى C_f

5- ننشئ C_f في مستوى منسوب إلى م.م.م

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma



6- نحدد مبيانيا عدد حلول المعادلة $2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0$

$$2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0 \Leftrightarrow m(1-e^x)=2x(1-e^x)-e^x$$

نلاحظ أن 0 ليس حلا للمعادلة مهما كانت m

ومنه $$2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0 \Leftrightarrow m=2x+\frac{e^x}{e^x-1} \Leftrightarrow m=f(x)$$

تحديد عدد حلول المعادلة $2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0$ يرجع الى تحديد عدد نقط تقاطع C_f و المستقيم ذا المعادلة $y=m$

مبيانيا لدينا :

إذا كان $m\in]-1-2\ln 2;2+2\ln 2[$ فان المعادلة $2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0$ لا تقبل حلا

إذا كان $m=2+2\ln 2$ أو $m=-1-2\ln 2$ فان المعادلة $2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0$ تقبل حلا وحيدا

إذا كان $m\in]-\infty;-1-2\ln 2[\cup]2+2\ln 2;+\infty[$ فان المعادلة $2xe^x-(m-1)e^x-2x+m=0$ تقبل حلين مختلفين

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

تمرين6

نعتبر الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة ب

$$\begin{cases} f(x)=e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)} & ; \quad x\succ 1 \\ f(x)=(1-x)\ln(1-x) & ; \quad x\prec 1 \\ f(1)=0 \end{cases}$$

1- حدد $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$

2- أدرس الاشتقاق عند 1 و أول النتيجتين هندسيا

3- أحسب $f'(x)$ على كل من $]1;+\infty[$ و $]-\infty;1[$ و أعط جدول التغيرات

4- أدرس الفروع اللانهائية و أنشئ C_f

الحل

$$\begin{cases} f(x)=e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)} & ; \quad x\succ 1 \\ f(x)=(1-x)\ln(1-x) & ; \quad x\prec 1 \\ f(1)=0 \end{cases}$$

1- نحدد $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$

نضع $t=1-\frac{1}{x}$ أي $x=-\frac{1}{t-1}$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{t\to 1^-} e^{-\frac{\ln(t)}{t-1}}=\frac{1}{e}$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}(1-x)\ln(1-x)=+\infty$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(1-x)\ln(1-x)=0 \quad \text{و} \quad \lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}=0$$

2- ندرس الاشتقاق عند 1 و نؤول النتيجتين هندسيا

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}}{e^{\ln(x-1)}}=\lim_{x\to 1^+} e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)-\ln(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1^+} e^{(x-1)\ln(x-1)-x\ln x}=1$$

f قابلة للاشتقاق على يمين 1 و المعامل الموجه للمماس على يمين 1 هو 1

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}-\ln(1-x)=+\infty$$

f غير قابلة للاشتقاق على يسار 1 و C_f يقبل مماس عمودي على يسار 1

3- نحسب $f'(x)$ على كل من $]1;+\infty[$ و $]-\infty;1[$ و نعطي جدول التغيرات

$$\forall x\in]1;+\infty[\quad f'(x)=\left(\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)+x\left(\frac{\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x}}\right)\right)e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\left[\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x-1}\right]e^{x\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)}$$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

نعتبر $\forall x \in]1;+\infty[\quad h(x)=\frac{1}{x-1}+\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)$

$\forall x \in]1;+\infty[\quad h'(x)=\frac{-1}{(x-1)^2}+\frac{1}{x(x-1)}=\frac{-1}{x(x-1)^2}$

ومنه h تناقصية على $]1;+\infty[$ و حيث $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)=0$ فان $\forall x \in]1;+\infty[\quad h(x)\le 0$

ومنه $\forall x \in]1;+\infty[\quad f'(x)\le 0$ إذن f تناقصية على $]1;+\infty[$

* $\forall x \in]-\infty;1[\quad f'(x)=-1-\ln(1-x)$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow -1-\ln(1-x)=0 \Leftrightarrow x=1-e^{-1}$

ومنه $\forall x \in]1-e^{-1};1[\quad f'(x)\succ 0$ و $\forall x \in]-\infty;1-e^{-1}] \quad f'(x)\le 0$

إذن f تزايدية على $]1-e^{-1};1[$ و تناقصية على $]-\infty;1-e^{-1}]$

جدول التغيرات

x	$-\infty$		$1-e^{-1}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	$\|$	$+$	
f	$+\infty$	↘	$-e^{-1}$	↗	0	↗	e^{-1}

7- ندرس الفروع اللانهائية و ننشئ C_f

* لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\frac{1}{e}$ ومنه المستقيم ذا المعادلة $y=\frac{1}{e}$ مقارب للمنحنى C_f

* لدينا $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)==+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x)=-\infty$

ومنه C_f يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب

تمرين7

لتكن الدالة العددية f للمتغير الحقيقي المعرفة بما يلي:

$$\begin{cases} f(x)=e^x\sqrt{1-e^{2x}} & ,x\le 0 \\ f(x)=e^{\frac{\ln x}{x}} & ,x\succ 0 \end{cases}$$

1. **أ/** بين أن $D_f=\mathbb{R}$ حيث D_f مجموعة تعريف الدالة f.

ب/ أحسب نهايات f عند محدات D_f. ثم أول النتائج هندسيا.

2. **أ/** ادرس اتصال f عند $x_0=0$.

ب/ ادرس اشتقاق f عند $x_0=0$. ثم أول النتيجة هندسيا.

3. **أ/** أثبت أن f' الدالة المشتقة للدالة f معرفة كما يلي:

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

$$\begin{cases} f'(x)=\dfrac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}(1-2e^{2x}) & ,x<0 \\ f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}e^{\frac{\ln x}{x}} & ,x>0 \end{cases}$$

ب/ استنتج تغيرات الدالة f .و أنشئ جدول التغيرات.

4. اكتب معادلة المماس لـ C_f في النقطة $A(1,1)$.

5. أنشئ C_f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{i},\vec{j})$ بحيث $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=2cm$

6. لتكن g قصور الدالة f على المجال $I=\left[-\frac{1}{2}\ln 2\ ,\ 0\right]$

أ/ بين أن g تقابل من I نحو مجال J يتم تحديده

ب/أنشئ جدول تغيرات g^{-1} الدالة العكسية للدالة g

ج/حدد الصيغة $g^{-1}(x)$ لكل x من J

ملحوظة: نعتبر التقريبات التالية: $e\simeq 2.7$ $e^{\frac{1}{e}}\simeq 1.4$ $\ln 2\simeq 0.7$

الحل

$$\begin{cases} f(x)=e^x\sqrt{1-e^{2x}} & ,x\le 0 \\ f(x)=e^{\frac{\ln x}{x}} & ,x>0 \end{cases}$$

1. أ/ نبين أن $D_f=\mathbb{R}$

$1-e^{2x}\ge 0$ ومنه $f(x)\in\mathbb{R}$ $\forall x\le 0$ وبالتالي $]-\infty;0]\subset D_f$

$e^{\frac{\ln x}{x}}\in\mathbb{R}$ ومنه $]0,\infty[\subset D_f$ $\forall x>0$ إذن $D_f=\mathbb{R}$

ب/ نحسب نهايات f عند محدات D_f . ثم نؤول النتائج هندسيا.

* $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}e^x\sqrt{1-e^{2x}}=0$ ومنه المستقيم ذا المعادلة $y=0$ مقارب أفقي للمنحنى C_f

* لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln x}{x}}=1$

ومنه المستقيم ذا المعادلة $y=1$ مقارب أفقي للمنحنى C_f

2. أ/ ندرس اتصال f عند $x_0=0$.

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}e^x\sqrt{1-e^{2x}}=0$ و $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{\ln x}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}\ln x}=0$

ومنه $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(0)$ اذن f متصلة في 0

ب/ ندرس اشتقاق f عند $x_0=0$. ثم نؤول النتيجة هندسيا.

$$\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{e^x\sqrt{1-e^{2x}}}{x}=\lim_{x\to0^-}-e^x\sqrt{\frac{1-e^x}{-x}}\sqrt{\frac{1+e^x}{-x}}=-\infty$$

f غير قابلة للاشتقاق في0 على اليسار و تقبل نصف مماس عمودي عند النقطة ذات الأفصول 0

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{\frac{\ln x}{x}}}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{\frac{\ln x}{x}}}{e^{\ln x}}=\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x}(\ln x-x\ln x)}=0$$

f قابلة للاشتقاق في0 على اليمين و تقبل نصف مماس أفقي عند النقطة ذات الأفصول 0

3. أ/ نثبت أن f' الدالة المشتقة للدالة f معرفة كما يلي:

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}e^{\frac{\ln x}{x}} \quad ,x\succ 0 \qquad f'(x)=\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}(1-2e^{2x}) \quad ,x\prec 0$$

لدينا $\forall x\prec 0 \quad f(x)=e^x\sqrt{1-e^{2x}}$

ومنه $\forall x\prec 0 \quad f'(x)=e^x\sqrt{1-e^{2x}}+e^x\frac{-e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}=e^x\left(\frac{1-e^{2x}-e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}\right)=\frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}(1-2e^{2x})$

ومنه $\forall x\succ 0 \quad f(x)=e^{\frac{\ln x}{x}}$ $\forall x\succ 0 \quad f'(x)=\left((\frac{\ln x}{x})'\right)e^{\frac{\ln x}{x}}=\frac{1-\ln x}{x^2}e^{\frac{\ln x}{x}}$

ب/ نستنتج تغيرات الدالة f .و نعطي جدول التغيرات.

* على $]-\infty;0[$ اشارة $f'(x)$ هي اشارة $1-2e^{2x}$

$$1-2e^{2x}=0\Leftrightarrow e^{2x}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\frac{-\ln 2}{2}$$

* على $]0;+\infty[$ اشارة $f'(x)$ هي اشارة $1-\ln x$


$$1-\ln x=0\Leftrightarrow x=e$$

x	$-\infty$		$-\frac{\ln 2}{2}$		0		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$	
f		0	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{e^e}$	$\searrow$ 1

4. نكتب معادلة المماس لـ C_f في النقطة $A(1,1)$.

لدينا $f'(1)=1$ و $f(1)=1$ ومنه معادلة المماس لـ C_f في النقطة $A(1,1)$ هو المستقيم ذا المعادلة $y=x$

5. ننشئ C_f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{i},\vec{j})$



للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

6. لتكن g قصور الدالة f على المجال $I=\left[-\frac{1}{2}\ln 2\ ,\ 0\right]$

أ/ نبين أن g تقابل من I نحو مجال J يتم تحديده

g متصلة على I وتناقصية قطعا على I و $g(I)=\left[0;\frac{1}{2}\right]$

ومنه g تقابل من I نحو مجال $J=\left[0;\frac{1}{2}\right]$

ب/ جدول تغيرات الدالة g^{-1}

x	0	$\frac{1}{2}$
g^{-1}	0 ↘	$-\frac{\ln 2}{2}$

ج/نحدد الصيغة $g^{-1}(x)$ لكل x من J

ليكن $x\in\left[0;\frac{1}{2}\right]$ و $y\in\left[-\frac{1}{2}\ln 2\ ,\ 0\right]$

$$g^{-1}(x)=y\Leftrightarrow g(y)=x\Leftrightarrow e^{y}\sqrt{1-e^{2y}}=x\Leftrightarrow e^{2y}\left(1-e^{2y}\right)=x$$

نضع $Y=e^{2y}$ و $Y\in\left[\frac{1}{2};1\right]$

$$g^{-1}(x)=y\Leftrightarrow Y^{2}-Y+x=0$$

$$\Leftrightarrow\left(Y-\frac{1}{2}\right)^{2}=\frac{1}{4}-x$$

$$\Leftrightarrow Y=\sqrt{\frac{1}{4}-x}+\frac{1}{2}$$

ومنه $g^{-1}(x)=y\Leftrightarrow e^{2y}=\sqrt{\frac{1}{4}-x}+\frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow y=\frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{\frac{1}{4}-x}+\frac{1}{2}\right)$$

إذن $g^{-1}(x)=\frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{\frac{1}{4}-x}+\frac{1}{2}\right)$ $\forall x\in J$

تمرين8

لتكن f دالة عددية لمتغير حقيقي حيث $f(x)=\dfrac{x^{2}-x+\ln(x-1)}{(x-1)^{2}}$

و ليكن C_f منحنى f في معلم متعامد ممنظم $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$ حيث $\left\|\vec{i}\right\|=2cm$

1- حدد D_f ثم النهايات عند محدات D_f

2- لتكـــن g دالة عددية لمتغير حقيقي حيث $g(x)=2-x-2\ln(x-1)$

أ) أدرس تغيرات الدالة g و أعط جدول تغيراتها

ب) بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا هو 2

3- أ) أدرس تغيرات f

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

ب) أعط جدول قيم لدالة f ممثلا في صور الأعداد $\frac{3}{2}$; $\frac{11}{8}$; 3 ; 4 بالدالة f و قيم مقربة لهذه الصور

ج) بين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في $\left]\frac{11}{8};\frac{3}{2}\right[$

4- أنشئ المنحنى C_f (نقبل أن النحنى C_f يقبل نقطة انعطاف أفصوله محصور بين 2 و3

ملاحظة: $\ln 2 \simeq 0,69$; $\ln 3 \simeq 1,09$

الحل

$$f(x)=\frac{x^2-x+\ln(x-1)}{(x-1)^2}$$

1- نحدد D_f ثم النهايات عند محدات D_f

$x \in D_f \Leftrightarrow x-1 \succ 0 \Leftrightarrow x \succ 1$ إذن $D_f=]1;+\infty[$

* $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{x^2-x+\ln(x-1)}{(x-1)^2}=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1}{(x-1)^2}\left[x^2-x+\ln(x-1)\right]=-\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x+\ln(x-1)}{(x-1)^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x-1}-\frac{1}{2}\times\left[\frac{1}{(x-1)^2}\ln\frac{1}{(x-1)^2}\right]=1$$

2- $g(x)=2-x-2\ln(x-1)$

أ) ندرس تغيرات الدالة g و نعطي جدول تغيراتها

$D_g=]1;+\infty[$

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[2-x-2\ln(x-1)\right]=-\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to 1} g(x)=\lim\limits_{x\to 1}\left[2-x-2\ln(x-1)\right]=+\infty$

$\forall x\in]1;+\infty[$ $\quad g'(x)=-1-\frac{2}{x-1}=\frac{-x-1}{x-1}$

x	1		$+\infty$
$g'(x)$		-	
g	$+\infty$	↘	$-\infty$

ب) نبين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا هو 2

لدينا g متصلة و تزايديا قطعا على $]1;+\infty[$ و $g(2)=0$ اذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا هو 2

3- أ) ندرس تغيرات f

$\forall x\in]1;+\infty[$ $\quad f'(x)=\frac{\left(2x-1+\frac{1}{x-1}\right)(x-1)^2-2(x-1)\left(x^2-x+\ln(x-1)\right)}{(x-1)^4}$

$=\frac{2x^2-3x+2-2x^2+2x-2\ln(x-1)}{(x-1)^3}=\frac{-x+2-2\ln(x-1)}{(x-1)^3}$

إذن $\quad f'(x)=\frac{g(x)}{(x-1)^3}$ $\quad \forall x\in]1;+\infty[$

من 2 أ) و ب) نستنتج أن $f'(x)\succ 0$ $\forall x\in]1;2[$ و $f'(x)\prec 0$ $\forall x\in[2;+\infty[$

x	1		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

f	$-\infty$ ↗ 2 ↘ 1

ب) جدول قيم لدالة f لبعض الأعداد $\frac{3}{2}$; $\frac{11}{8}$; 3 ; 4 بالدالة f و قيم


x	4	3	$\frac{3}{2}$	$\frac{11}{8}$
$f(x)$	$\frac{12+\ln 3}{9}$	$\frac{6+\ln 2}{4}$	$3-4\ln 2$	$\frac{33+64\ln\frac{3}{8}}{9}$
$\approx f(x)$	$1,45$	$1,67$	$0,23$	$-3,31$

ج) نبين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في $\left]\frac{11}{8};\frac{3}{2}\right[$

لدينا f متصلة على و تزايدية قطعا على $\left]\frac{11}{8};\frac{3}{2}\right[$ و $f\left(\frac{11}{8}\right)\times f\left(\frac{3}{2}\right)\prec 0$

ومنه المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا في $\left]\frac{11}{8};\frac{3}{2}\right[$

4- ننشئ المنحنى C_f في معلم متعامد ممنظم $(O;\vec{i};\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\|=2cm$



للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

A) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\ln(x+1)-\ln x-\frac{1}{x+1}+1$

1- بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$

2- بين أن $g'(x)=\frac{-1}{x(x+1)^2}$ لكل x من $]0;+\infty[$ و استنتج منحى تغيرات g على $]0;+\infty[$

3- استنتج أن $g(x)\succ 0$ $\forall x\in]0;+\infty[$

B) لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ

$$\begin{cases} f(x)=x\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)+x+1 & ;x\succ 0 \\ f(x)=(1-x)e^x & ;x\le 0 \end{cases}$$

و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O;\vec{i};\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=2cm$

1- أ/ بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)=1$ ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

ب/ حدد $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و أول النتيجة هندسيا

ج/ بين أن f متصلة في 0 .

2- أدرس قابلية اشتقاق f على اليمين في 0 و على اليسار في 0 ثم أول النتيجتين هندسيا.

3- أ/ بين أن $f'(x)=g(x)$ $\forall x\in]0;+\infty[$ و أن $f'(x)=-xe^x$ $\forall x\in]-\infty;0[$

ب/ أعط جدول تغيرات f .

4- بين أن النقطة A ذات الافصول 1- نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

5- بين أن المستقيم ذا المعادلة $y=x+2$ مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

6- أنشئ المنحنى (C_f).

$e^{-3}\approx 0,05$ $e^{-2}\approx 0,14$ $e^{-1}\approx 0,37$ $\ln 3\approx 1,1$ $\ln 2\approx 0,7$

الحل

(A g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=\ln(x+1)-\ln x-\frac{1}{x+1}+1$

4- نبين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(x+1)-\ln x-\frac{1}{x+1}+1\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}+1\right)=1$$

5- نبين أن $g'(x)=\frac{-1}{x(x+1)^2}$ لكل x من $]0;+\infty[$ و نستنتج منحى تغيرات g على $]0;+\infty[$

ليكن x من $]0;+\infty[$ $g(x)=\ln(x+1)-\ln x-\frac{1}{x+1}+1$

و منه

$$g'(x)=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{(x+1)^2}=\frac{x(x+1)-(x+1)^2+x}{x(x+1)^2}=\frac{x^2+x-x^2-2x-1+x}{x(x+1)^2}=\frac{-1}{x(x+1)^2}$$

$\frac{-1}{x(x+1)^2}\prec 0$ $\forall x\in]0;+\infty[$ أي $g'(x)\prec 0$ $\forall x\in]0;+\infty[$

اذن g تناقصية قطعا على $]0;+\infty[$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

6- نستنتج أن $\forall x \in]0;+\infty[\quad g(x) \succ 0$

لدينا g تناقصية قطعا على $]0;+\infty[$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=1$

اذن $\forall x \in]0;+\infty[\quad g(x) \succ 0$

B) f الدالة العددية للمتغير الحقيقي المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$\begin{cases} f(x)=x\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right)+x+1 & ;x\succ 0 \\ f(x)=(1-x)e^{x} & ;x\le 0 \end{cases}$$

1- أ/ نبين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right)=1$ ثم نستنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

نضع $x=\dfrac{1}{t}$ ومنه $t=\dfrac{1}{x}$ و بالتالي $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(t+1)}{t}=1$

و منه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right)+x+1=+\infty$

ب/ نحدد $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ونؤول النتيجة هندسيا

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}(1-x)e^{x}=\lim_{x\to-\infty} e^{x}-xe^{x}=0$$

و منه محور الافاصيل مقارب للمنحنى (C_f)

ج/ نبين أن f متصلة في 0 .

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+} x\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)+x+1=\lim_{x\to 0^+} x\ln(x+1)-x\ln(x)+x+1=1$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(1-x)e^{x}=1$$

ومنه $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=f(0)$ اذن f متصلة في 0 .

2- ندرس قابلية اشتقاق f على اليمين في 0 و على اليسار في 0 ثم نؤول النتيجتين هندسيا.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{(1-x)e^{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{e^{x}-1}{x}-e^{x}=1-1=0$$

و منه f قابلية اشتقاق على اليسار في 0 و تقبل نصف مماس أفقي على يسار في 0

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right)+x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+1=+\infty$$

و منه f غير قابلية الاشتقاق على اليمين في 0 و تقبل نصف مماس عمودي على يمين في 0

3- أ/ نبين أن $f'(x)=g(x) \quad \forall x\in]0;+\infty[$ و أن $f'(x)=-xe^{x} \quad \forall x\in]-\infty;0[$

ليكن $x\in]0;+\infty[\qquad f(x)=x\ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right)+x+1$

$$f'(x)=\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)+x\frac{\dfrac{-1}{x^2}}{\dfrac{x+1}{x}}+1=\ln(x+1)-\ln x-\frac{1}{x+1}+1=g(x)$$

ليكن $x\in]-\infty;0[\qquad f(x)=(1-x)e^{x}$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

$$f'(x)=-e^x+(1-x)e^x=-xe^x$$

ب/ نعطي جدول تغيرات f.

x	$+\infty$		0		$-\infty$
$f'(x)$	$+$		$\|\|$		$+$
$f(x)$	0	↗		↗	$+\infty$

4- نبين أن النقطة A ذات الافصول 1- نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

ليكن $x\in]-\infty;0[$ $\quad f'(x)=-xe^x$

$$f''(x)=-e^x-xe^x=-(x+1)e^x$$

$$f''(x)\Leftrightarrow -(x+1)e^x=0\Leftrightarrow x=-1$$

x	0		-1		$-\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

اذن النقطة A ذات الافصول 1- نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

5- نبين أن المستقيم ذا المعادلة $y=x+2$ مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.


$$\lim_{x\to+\infty} f(x)-(x+2)=\lim_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)-1=1-1=0$$

اذن المستقيم ذا المعادلة $y=x+2$ مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

6- ننشئ المنحنى (C_f).

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma



تمارين

تمرين1

أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\frac{1}{x}\right)^x$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^x$

تمرين2

أدرس و مثل مبيانيا الدالة f حيث $\begin{cases} f(x)=x^{2x} \\ f(0)=1 \end{cases}$

تمرين3

1- حل في $\mathbb{R}$ المعادلات $e^{4x-3}=2$; $e^{x^2-3x-3}=e$ $3e^{3x}-2e^{2x}-e^x=0$

2- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات

$3^{2x}-3^x-6\succ 0$ $e^x-2e^{-x}+1\succ 0$; $2e^{2x}-3e^x+1\prec 0$

3- حل في $\mathbb{R}^2$ النظمة $\begin{cases} x+2y=1 \\ 2^x=3^y \end{cases}$

تمرين4

أحسب

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-e^{x}}{x}$; $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-1}{e^{2x}-3e^{x}+2}$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x}+1}{x^{3}}$; $\lim\limits_{x\to-\infty}x^{2}e^{x}$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x}+2}{e^{x}-1}$

$\lim\limits_{x\to 0^{+}}x^{\sqrt{x}}$ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}^{x}-1}{x-1}$

تمرين5

I- نعتبر الدالة العددية f لمتغير حقيقي المعرفة بما يلي $f(x)=2e^{2x}-3e^{x}+1$

1-أ- حدد D_f ونهايات f عند محدات D_f

ب- أدرس تغيرات f

2- أ- حدد نقطة تقاطع C_f و محور الأفاصيل

ب- حدد معادلة المماس لـ C_f عند النقطة ذات الأفصول 0

ج- أدرس الفروع اللانهائية لـ C_f

د- أنشئ C_f

II- نعتبر الدالة g المعرفة بـ $g(x)=\ln(2e^{x}-3e^{x}+1)$

1- أ- حدد D_g و نهايات g عند محدات D_g

ب- أدرس تغيرات g

2- أدرس الفروع اللانهائية لـ C_g ثم أنشئ C_g

تمرين6

نعتبر الدالة العددية f لمتغير حقيقي المعرفة بما يلي

$$\begin{cases} f(x)=\left|2x(1-\ln x)\right| & x>0 \\ f(x)=e^{x}-1-2\sqrt{1-e^{x}} & x\le 0 \end{cases}$$

1- أدرس اشتقاق و اتصال f عند النقطتين 0 و e

و أعط التأويل الهندسي للنتائج المحصل عليها

2- أحسب نهايات f عند محدات D_f ثم أدرس الفروع للانهائية لـ C_f

3- أدرس تغيرات f و أنشئ C_f $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=2cm$

4- بين أن g قصور الدالة f على $]-\infty;0]$ تقابل من $]-\infty;0]$ نحو مجال J يجب تحديده

أحسب $g^{-1}(x)$ لكل x من J

تمرين7

I- نعتبر الدالة f المعرفة على $D=[0;1[\cup]1;+\infty[$ بحيث $f(x)=\dfrac{2x^{2}}{x^{2}-1}+\ln\left|x^{2}-1\right|$

1- أحسب نهايات f عند محدات D.

2- بين أن $f'(x)=\dfrac{2x(x^{2}-3)}{(x^{2}-1)^{2}}$ لكل x من D و أعط جدول تغيرات f

3 - استنتج مما سبق إشارة $f(x)$ لكل x من D

II- لتكن g الدالة المعرفة على D بـ $g(x)=x\ln\left|x-1\right|$

1- أ- أحسب نهايات g عند محدات D.

ب- أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{g(x)}{x}$ و أعط تأويلا هندسيا للنتيجة المحصل عليها.

2- بين لكل x من D $g'(x)=f(x)$ و أعط جدول تغيرات g.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

3- أ- استنتج من دراسة الدالة f إحداثيتي I نقطة انعطاف المنحنى C_g

ب- حل في D المعادلة $g(x)=0$

ج- أنشئ C_g

تمرين8

الجزء الأول

لتكن f الدالة المعرفة بـ $f(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)e^{2x}-4(x-1)e^{x}-2$

1- أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و بين لكل x من $\mathbb{R}$ $f(x)=xe^{2x}\left(1-\frac{1}{2x}-\frac{4}{e^{x}}+\frac{4}{xe^{x}}-\frac{2}{xe^{2x}}\right)$

ثم استنتج $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

2- أدرس تغيرات f

3- أ- أدرس الفروع اللانهائية لـ C_f

ب- بين أن C_f يقطع محور الأفاصيل في نقطة x_0 تنتمي إلى $[-2;-1]$

$\left(e^{4}\simeq\frac{225}{4};\quad e^{2}\simeq\frac{15}{2};\quad e\simeq\frac{11}{4}\right)$

ج- أنشئ C_f $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=2cm$

الجزء الثاني

لتكن g الدالة المعرفة بـ $\begin{cases} g(x)=(x^2-4x)\ln x-\frac{1}{2}(x^2-8x+4) & x\succ 0 \\ g(0)=-2 \end{cases}$

1- بين أن $g(x)=f(\ln x)$ $\forall x\in]0;+\infty[$

2- أدرس اتصال و اشتقاق g في يمين 0

3- أدرس تغيرات g

4- أ- أدرس الفروع اللانهائية لـ C_g

ب- أستنتج من 2- ب- في الجزء الأول , تأطيرا لأفصول نقطة تقاطع C_g ومحور الأفاصيل

ج- حدد نصف المماس لـ C_g في النقطة ذات الأفصول 0 ثم أنشئ C_g

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma