حـــــــــــــــــل تماريـــــتن الـــــدوال الخـــــطية و التـــــــآلفية

حل التمرين الأول:

1- بما أن f دالة خطية فإنها تكتب على شكل $a \in IR\ ;\ f(x) = ax$

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) = a(\alpha x_1 + \beta x_2)$$
$$= \alpha a x_1 + \beta a x_2$$
$$= \alpha f(x_1) + \beta f(x_2)$$

2- نضع $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ في علاقة السؤال (1)

تحصل على :

$$f\left(\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2\right) = f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$
$$= \frac{1}{2}f(x_1) + \frac{1}{2}f(x_2)$$
$$= \frac{1}{2}(f(x_1) + f(x_2))$$

حل التمرين الثاني:

لدينا :

$$-2x - 6 + 3f(x) = -6 - 3f(x)$$
$$-2x - 6 + 6 = -3f(x) - 3f(x)$$
$$-6f(x) = -2x$$
$$f(x) = \frac{-2x}{-6} = \frac{1}{3}x$$

و بالتالى f دالة خطية

2- بما أن f دالة خطية فإن $f(7x) = 7f(x)$

و بالتالي $\frac{1}{7}f(7x) = f(x)$

3- Cf يمر من النقطة $A(\alpha , 1)$ إذن $f(\alpha) = 1$

من جهة اخرى $f(\alpha) = \frac{1}{3}\alpha$

إذن $\frac{1}{3}\alpha = 1$ و منه فإن $\alpha = 3$

Cf يمر من $B(3 , \beta)$ يعني $f(3) = \beta$

يعني $\frac{1}{3} \times 3 = \beta$

إذن $\beta = 1$

حل التمرين الثالث:

لدينا f دالة خطية بحيث $f(1) = 5$

لدينا $f(x) = ax$; $f(1) = a \times 1 = a$

Talamid.ma: هذا الملف تم تحميله من موقع
Talamid.ma: الملفات تم بزيارة الموقع للمزيد من

إذن $a = 5$

و بالتالي الدالة الخطية f تكتب على شكل $f(x) = 5x$

إذن قيمة $f(2)$ هي : $f(2) = 5 \times 2 = 10$

حل التمرين الرابع

1- ليكن x إنتاج سنة معينة

في السنة الموالية سيكون الإنتاج هو $x + (4\%)x$

و لدينا $4\% = \frac{4}{100} = 0,04$

و بالتالي سيكون الإنتاج هو $x + 0,04 = x\,(1 + 0,04)$

$= 1,04\,x$

إذن الإنتاج هو $1,04\,x$ الذي هو صورة x بدالة خطية هي f بحيث $f(x) = 1,04\,x$

2- بتطبيق مباشر للسؤال الأول باستخدام الدالة الخطية f التي تعطينا إنتاج السنة الموالية إذاعرفنا إنتاج السنة الأولى :

$f(5000) = 1,04 \times 5000 = 5200$

و بالتالي سيكون إنتاج السنة الموالية هو 5200 آلة

حل التمرين الخامس:

1- بما أن f دالة تآلفية فإنها تكتب على شكل :

$f(x) = a\,x + b$ مع $a , b \in IR$

لدينا $f(1) = a + b = 2$ و $f(-1) = -a + b = 4$ (1)

إذن $a = 2 - b$

ثم نعوض قيمة a في العلاقة (1)

$-(2 - b) + b = 4$

$2b - 2 = 4$

يعني $b = 3$

و $a = 2 - b = -1$

إذن $f(x) = -x + 3$

2- بما أن Cf و Cg متوازيان فإن لمعادلتي f و g نفس المعامل يعني أن $k = -1$

و بالتالي $g(x) = -x$

حل التمرين السادس:

بما أن f دالة تآلفية فإنها تكتب على شكل $f(x) = a\,x + b$

مع a و b عددان حقيقيان يجب تحديدهما

$f(2x - 3) = a\,(2x - 3) + b = 2\,a\,x + b - 3a$

$f(2 - x) = a\,(2 - x) + b = -a\,x + 2\,a + b$

Talamidi.ma : موقع تلاميذي يوفر لك دروس و تمارين و اختبارات الوطنية و الجهوية مع تصحيحها

نطبق العلاقة :

$2 a x + b - 3a + 3 (-a x + 2 a + b) = 3 x - 1$

يعني $2 a x - 3 a x + b - 3 a + 6 a + 3 b - 3 x - 1 = 0$

$-a x - 3 x + 4 b + 3 a + 1 = 0$

$(-a - 3) x + 3 a + 4 b + 1 = 0$

بتطبق الخاصية التالية :

مهما يكن x بحيث $\alpha x + \beta = 0$

فإن $\alpha = 0$ و $\beta = 0$

إذن $-a - 3 = 0$ و $3 a + 4 b + 1 = 0$

يعني $a = -3$ و $3(-3) + 4 b + 1 = 0$

$-9 + 4 b + 1 = 0$

يعني $4 b = 8$ إذن $b = 2$

و بالتالي $f (x) = - 3 x + 2$

2- لدينا $f (x) = 5$ يعني $- 3 \alpha + 2 = 5$

إذن $- 3 \alpha = 3$

$\alpha = - 1$

حل التمرين السابع:

1- بصفة عامة $E (\alpha , \beta)$ تنتمي إلى Cf

إذا كان لدينا $f (\alpha) = \beta$

$f (1) = (\sqrt{3} + 1) \times 1 + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + 1 \neq \sqrt{3}$

و باتالي $A \notin Cf$

$f (0) = (\sqrt{3} + 1) \times 0 + \sqrt{3} = \sqrt{3}$

إذن $B \in Cf$

2- C تنتمي إلى Cf إذ $f (m - 1) = \sqrt{3} (m + 1)$

إذن : $(\sqrt{3} + 1) (m - 1) + \sqrt{3} = \sqrt{3} (m + 1)$

$- \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} m + m + \sqrt{3} = \sqrt{3} m + \sqrt{3}$

$m = 1 + \sqrt{3}$

Talamidma : موقع تلاميذ المدارس لتبادل الدروس والتمارين

Talamidma : موقع تلاميذ المدارس لتبادل الدروس والتمارين