هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
www.nacermaths.com
الأستاذ : نـــاصر ب.

حلول التمارين

الدالة الخطية و الدالة التآلفية

المستوى : الثالثة ثانوي إعدادي

تمرين ① :

1) –أ) -- حساب : $f(3)$ و $f(-1)$:

لدينا : $f(3)=\frac{2}{3}\times 3=2$ و $f(-1)=\frac{2}{3}\times(-1)=\frac{-2}{3}$.

ب) -- لنحدد العدد الذي صورته $\frac{1}{5}$ بالدالة f .

لدينا $f(x)=\frac{1}{5}$ يعني أن : $\frac{2}{3}x=\frac{1}{5}$ و منه فإن : $10x=3$ و بالتالي فأن : $x=\frac{10}{3}$

إذن : العدد الذي صورته $\frac{1}{5}$ بالدالة f هو $\frac{10}{3}$.

ج) -- لنثبت أن (Δ) يمر من $A(6;4)$:

لدينا : $f(x_A)=\frac{2}{3}\times x_A=\frac{2}{3}\times 6=\frac{12}{3}=4$

و بما أن $y_A=4$ فإن : $f(x_A)=y_A$ و بالتالي فإن : $A(6;4)\in(\Delta)$ أي أن (Δ) يمر من النقطة $A(6;4)$.

2) –أ) -- لنحدد صورة 5 و $\frac{-1}{2}$ بالدالة g .

لدينا : $g(5)=5+2=7$ ، إذن : $\boxed{g(5)=7}$.

و لدينا : $g\left(\frac{-1}{2}\right)=\frac{-1}{2}+2=\frac{-1+4}{2}=\frac{3}{2}$ ، إذن : $\boxed{g\left(\frac{-1}{2}\right)=\frac{3}{2}}$.

ب)-- لنحدد العدد الذي صورته -7 بالدالة g .

لدينا : $g(x)=-7$ يعني أن : $x+2=-7$ ، و منه فإن : $x=-7-2$ أي : $\boxed{x=-9}$

إذن العدد الذي صورته -7 بالدالة g هو -9 .

ج) -- لنتحقق من أن : $B(-5;-3)$ تنتمي إلى (D) التمثيل المبياني للدالة g .

لدينا : $f(-5)=-5+2$ ، و منه فإن : $f(-5)=-3$.

و بما أن : $B(-5;-3)$ فإن : $B(-5;-3)\in(D)$.

3) –أ) -- لننشئ (D) و (Δ) في نفس المعلم $(O;I;J)$.

نعتبر الجدولين الآتيين :


x	1	-5
$g(x)$		
$M(x;f(x))$	$F(1;3)$	$E(-5;-3)$

x	6
$g(x)$	4
$M(x;f(x))$	$A(6;4)$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

إذن : $(D)=(BC)$ و $(\Delta)=(OA)$ ل



ب) -- لنحدد مبيانيا إحداثيتي E تقاطع (D) و (Δ).

لدينا من خلال الشكل : $E(-6;-4)$.

ج) -- لنحدد جبريا إحداثيتي E

لدينا : E تقاطع (D) و (Δ) يعني أن : $f(x_E)=g(x_E)$.

و منه فإن : $\frac{2}{3}x_E=x_E+2$ تكافئ على التوالي : $\frac{2}{3}x_E=\frac{3x_E+6}{3}$

$2x_E=3x_E+6$


$2x_E-3x_E=6$

$-x_E=6$

$x_E=-6$

و منه فإن : $g(-6)=-6+2=-4$. و بالتالي فإن : $E(-6;-4)$.

تمرين ② :



1) – لنثبت أن : $f(x)=2x-4$.

لدينا من خلال الشكل : و $\begin{cases} f(3)=2 \\ f(1)=-2 \end{cases}$

و بما أن f دالة تألفية فإن $f(x)$ على شكل : $f(x)=ax+b$.

*/ لنحدد a :

لدينا : $a=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{2+2}{2}=\frac{4}{2}=2$.

إذن : $f(x)=2x+b$.

*/ لنحدد b :

لدينا : $\begin{cases} f(3)=2\times 3+b \\ f(3)=2 \end{cases}$ و منه فإن : $2\times 3+b=2$ ، أي : $6+b=2$.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

إذن : $b=2-6$ أي : $b=-4$

و بالتالي فإن : $\boxed{f(x)=2x-4}$.


2) – لنحل جبريا المتراجحة : $f(x)\geq 2$.

لدينا : $f(x)\geq 2$ تكافئ على التوالي :

$$2x-4\geq 2$$
$$2x\geq 2+4$$
$$2x\geq 6$$
$$x\geq \frac{6}{2}$$
$$x\geq 3$$

إذن : جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 3 حلول هذه المتراجحة.

3) – لنحل مبيانيا المتراجحة : $f(x)\geq 2$. (أنظر الشكل).



أفاصيل النقط التي تنتمي إلى الجزء الملون بالأحمر من المستقيم (D) هي حلول هذه المتراجحة.

و هي الملونة باللون الأزرق

تمرين ③ :

1) – أ) – حساب : $f\left(\frac{-2}{3}\right)$ و $f(0)$:

لدينا : $\left.\begin{array}{l} f\left(\frac{-2}{3}\right)=-\cancel{3}\times\frac{-2}{\cancel{3}}+2 = 2+2=4 \\ f(0)=-3\times 0+2=0+2=2 \end{array}\right\}$ و

إذن : $\left.\begin{array}{l} f\left(\frac{-2}{3}\right)=4 \\ f(0) = 2 \end{array}\right\}$ و .

ب) – لنحدد العدد a :

لدينا : $f(3a)+4a=f(a-2)$ يعني أن : $-3\times 3a+2+4a=-3(a-2)$

أي : $-9a+4a=-3a+6$ و منه فإن : $-9a+4a+3a=6$

$$-2a=6$$
$$a=\frac{6}{-2}$$
$$\boxed{a=-3}$$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

2) – لنبين أن g دالة خطية :

لدينا : $g(x)=f(2x-1)-5$ يعني أن : $g(x)=-3(2x-1)+2-5$

$g(x)=-6x+3+2-5$

$\boxed{g(x)=-6x}$

و بالتالي فإن : g دالة خطية معاملها هو -6.

تمرين ④ :

1) – أ) -- لنبين أن : $f(x)=-2x$.

لدينا : f دالة خطية. إذن $f(x)$ على شكل : $f(x)=ax$.

*/ لنحدد a :

لدينا : $a=\dfrac{f(x)}{x}$ و $x\neq 0$.

و بما أن : النقطة $A(1;-2)$ تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة f فإن : $f(1)=-2$.

و منه فإن : $a=\dfrac{f(1)}{1}=\dfrac{-2}{1}=-2$. و بالتالي فإن : $\boxed{f(x)=-2x}$.

ب) -- لنثبت أن : $f(3)+f(x)=f(3+x)$.

لدينا : $\left.\begin{matrix} f(3)=-2\times 3 \\ f(x)=-2\times x \end{matrix}\right\}$ و إذن : $f(3)+f(x)=-2\times 3+(-2)\times x$ ، (نعمل بـ -2)

و منه فإن : $f(3)+f(x)=-2(3+x)$

و بما أن : $f(3+x)=-2(3+x)$ فإن : $\boxed{f(3)+f(x)=f(3+x)}$.

ج) -- لنثبت أن : $f(\sqrt{2}\,x)=\sqrt{2}\,f(x)$.

لدينا : $f(\sqrt{2}\,x)=-2\sqrt{2}\,x$

$=\sqrt{2}\times(-2x)$

و بما أن : $f(x)=-2x$ فإن : $\boxed{f(\sqrt{2}\,x)=\sqrt{2}\,f(x)}$.

2) – أ) -- لنحسب : $g(4)-g(2)$.

لدينا g دالة تآلفية معاملها 2 .

إذن : $\dfrac{g(x)-g(x')}{x-x'}=2$ و $x\neq x'$.

و منه فإن : $\dfrac{g(4)-g(2)}{4-2}=2$ يعني أن : $\dfrac{g(4)-g(2)}{2}=2$ ، و بالتالي فإن : $\boxed{g(4)-g(2)=4}$.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

ب) -- لنعبر عن $g(x)$ بدلالة x :

لدينا g دالة تآلفية معاملها 2 .

إذن : $g(x)$ على شكل : $g(x)=2x+b$.

*/ لنحدد b :

لدينا : $\begin{cases} g(-1)=2\times 1+b \\ g(-1)=2 \end{cases}$ ،

إذن : $2\times 1+b=2$ ، أي : $-2+b=2$ و منه فإن : $b=2+2=4$.

و بالتالي فإن : $\boxed{g(x)=2x+4}$.

ج) -- لنحدد إحداثيتي E :

لدينا E تقاطع المستقيم (D) و محور الأفاصيل يعني أن : $\begin{cases} E\in(D) \\ E\in(OI) \end{cases}$ و منه فإن : $\begin{cases} E\left(x_E\,;g(x_E)\right) \\ g(x_E)=0 \end{cases}$ و

إذن : $\begin{cases} E(x_E\,;0) \\ g(x_E)=0 \end{cases}$ و

$g(x_E)=0$ يعني أن : $2x_E+5=0$

$2x_E=-5$

$x_E=\dfrac{-5}{2}$

و بالتالي فإن : $\boxed{E\left(\dfrac{-5}{2}\,;0\right)}$.

د) -- لنحدد k :

لدينا : $F(-k\,;5+k)\in(D)$ بحيث : (D) التمثيل المبياني للدالة g .

إذن : $g(-k)=5+k$ ، أي : $2\times(-k)+4=5+k$

$-2k-k=5-4$

$-3k=1$


$k=\dfrac{-1}{3}$

و بالتالي فإن : $\boxed{k=\dfrac{-1}{3}}$.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

3) – إنشاء (D) و (Δ) في نفس المعلم : (الشكل جانبه) .



x	1
$f(x)$	-2
$M(x;f(x))$	$A(1;-2)$

x	1	-3
$g(x)$	6	-2
$M(x;g(x))$	$E(1;6)$	$F(-3;-2)$

لدينا إذن : $(\Delta)=(OA)$ و $(D)=(EF)$.

4) – أ) – لنحل جبريا المعادلة : $f(x)=g(x)$.

$f(x)=g(x)$ تكافئ على التوالي : $-2x=2x+4$

$-2x-2x=4$

$-4x=4$

$x=\dfrac{4}{-4}$

$x=-1$

إذن حل هذه المعادلة هو : -1 .

ب) – لنحل مبيانيا المعادلة : $f(x)=g(x)$.

الحل المبياني لهذه المعادلة هو أفصول نقطة تقاطع (D) و (Δ) .

لتكن M تقاطع (D) و (Δ) .

لدينا من خلال الشكل : $M(-1;2)$.

إذن : -1 هو حل هذه المعادلة.

تمرين ⑤ :

1) – لنحدد معامل f :

لدينا f دالة تألفية يعني أن : $m=\dfrac{f(x')-f(x)}{x'-x}$ و $x'\neq x$.

و بما أن : $\left.\begin{matrix}A(4;3)\in(D)\\B(2;4)\in(D)\end{matrix}\right\}$ و بحيث (D) هو التمثيل المبياني للدالة f فإن : $\left.\begin{matrix}f(4)=3\\f(2)=4\end{matrix}\right\}$.

و منه فإن : $m=\dfrac{f(4)-f(2)}{4-2}=\dfrac{3-4}{2}=\dfrac{-1}{2}$ و بالتالي فإن معامل f هو : $\dfrac{-1}{2}$.

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

2) – لنستنتج أن : $f(x)=\frac{-1}{2}x+5$.

لدينا f دالة تآلفية معاملها $\frac{-1}{2}$.

إذن : $f(x)=\frac{-1}{2}x+b$.

*/ لنحدد b :

لدينا : $\left.\begin{array}{l} f(4)=3 \\ f(4)=\frac{-1}{2}\times 4+b \end{array}\right\}$ و يعني أن : $\frac{-1}{2}\times 4+b=3$

$-2+b=3$

$b=3+2$

$b=5$

و بالتالي فإن : $\boxed{f(x)=\frac{-1}{2}x+5}$.

3) – لنحدد العدد الحقيقي a :

لدينا : $E\left(\frac{5}{2}a\,;4\right)\in(\Delta)$ بحيث : (Δ) التمثيل المبياني للدالة g و $g(x)=2x$.

إذن : $\left.\begin{array}{l} g\left(\frac{5}{2}a\right)=4 \\ g\left(\frac{5}{2}a\right)=2\times\frac{5}{2}a \end{array}\right\}$ يعني أن : $2\times\frac{5}{2}a=4$

$5a=4$

إذن : $\boxed{a=\frac{4}{5}}$

4) – لنحدد جبريا إحداثيتي F :

لدينا : F تقاطع (D) و محور الأراتيب يعني أن : $\left.\begin{array}{l} F\in(D) \\ F\in(OJ) \end{array}\right\}$ ، و منه فإن : $\left.\begin{array}{l} F\left(x_F\,;f\left(x_F\right)\right) \\ x_F=0 \end{array}\right\}$ و .

إذن : $F(0\,;f(0))$.

و بما أن : $f(0)=\frac{-1}{2}\times 0+5=0+5=5$ فإن : $\boxed{F(0\,;5)}$

للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma